

## נוסחאון מורחב במתמטיקה

לאחא قوانين موسعة في الرياضيات-4 وحدات تعليمية

### الجبر:

$x = \frac{-b}{2a}$       الدالة التربيعية:       $y = ax^2 + bx + c$  (a ≠ 0) ; قيم- x لرأس القطع المكافئ:

$x^2 + y^2 = R^2$       الهندسة التحليلية:      الدائرة التي مركزها رأس المحورين ونصف قطرها R :

القوى:       $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$        $a^{\frac{x}{y}} = \sqrt[y]{a^x}$  (y ≠ 0 a ≠ 0)

### حساب المثلثات:

مساحة الدائرة ومحيطها:       $P = 2\pi R$        $S = \pi R^2$

المتطابقات الاساسية:       $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$        $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$

$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$        $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$

$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$        $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$

## التفاضل والتكامل

### المشتقات:

$$(\sqrt{mx+b})' = \frac{m}{2\sqrt{mx+b}}$$

$$\left(\frac{1}{mx+b}\right)' = \frac{-1 \cdot m}{(mx+b)^2}$$

### التكاملات:

$$\int (mx+b)^t dx = \frac{1}{t+1} \cdot \frac{(mx+b)^{t+1}}{m} + C \quad (t \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{(mx+b)^2} dx = \frac{1}{m} \cdot \frac{-1}{(mx+b)} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{mx+b}} dx = \frac{2}{m} \cdot \sqrt{mx+b} + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos(mx+b) dx = \frac{1}{m} \sin(mx+b) + C$$

$$\int \sin(mx+b) dx = -\frac{1}{m} \cos(mx+b) + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int e^{mx+b} dx = \frac{1}{m} e^{mx+b} + C$$

$$\int a^{mx+b} dx = \frac{a^{mx+b}}{m \cdot \ln a} + C$$

$$\int \frac{1}{mx+b} dx = \frac{1}{m} \ln|mx+b| + C$$